



Veyxyl® Tabs

Amoxicillin
800 mg/Tablette



- Infektionen des Endometriums
- Nachgeburtshilfe





Amoxicillin, der Wirkstoff der Veyxyl® Tabs, ist ein halbsynthetisch hergestelltes, säurestables (daher oral anwendbares) Antibiotikum aus der Reihe der Penicilline mit bakterizider Wirkung. Amoxicillin stört in der Wachstumsphase der Bakterien den Zellwandaufbau durch kompetitive Hemmung von Transpeptidasen und verhindert die Quervernetzung der linearen Bausteinketten, die aus Aminozuckern und Aminosäuren bestehen. Dadurch können wegen mangelnder Festigkeit des Mukopeptid-Komplexes schädigende osmotische Einflüsse wirksam werden. Nach einer gewissen Latenzphase kommt es so bei proliferierenden Keimen zur Lyse. Bakterien im Ruhestadium werden nur geringgradig in bakteriostatischem Sinne beeinflusst. Die bakterizide Wirkung erfasst grampositive und gramnegative Erreger.

Amoxicillin zeichnet sich – verglichen mit Benzylpenicillin (Penicillin G) – durch ein breiteres antibakterielles Spektrum aus. Das Auftreten resistenter Stämme erfolgt in vitro, wie bei allen Penicillinen langsam und stufenweise, wobei Kreuzresistenzen gegenüber anderen Penicillinen bestehen. Amoxicillin weist eine geringe Toxizität auf und ist gut verträglich.

Für Veyxyl® Tabs besteht grundsätzlich keine Antibiogrammpflicht gemäß TÄHAV.

Veyxyl® Tabs

800 mg/Tablette

Tablette für Rinder, Schweine, Pferde, Schafe, Hunde

Wirkstoff: Amoxicillin als Amoxicillin-Trihydrat

Wirkstoffe und sonstige Bestandteile

1 Tablette enthält:

Wirkstoff:

Amoxicillin 800,00 mg (entsprechend 918,48 mg Amoxicillin-Trihydrat)

Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist:

-

Anwendungsgebiete

Zur Behandlung von folgenden, durch grampositive und/oder gramnegative Amoxicillin-empfindliche Keime hervorgerufene Krankheiten:

Hund, orale Anwendung:

Infektionen der Lunge und der Atemwege, Infektionen des Verdauungsapparates, Infektionen im Urogenitalbereich, lokalisierte Infektionen, bakterielle Sekundärinfektionen infolge von Viruserkrankungen.

Rind, Schwein, Pferd, Schaf; intrauterine Anwendung:

Infektionen des Endometriums, Nachgeburtshaltung

Vor der Anwendung von Veyxyl® Tabs sollte die Empfindlichkeit der Erreger nachgewiesen werden. Dies gilt aufgrund sehr hoher Resistenzraten bei E. coli und Salmonellen gegenüber Amoxicillin insbesondere für die Behandlung von Infektionen des Verdauungsapparates.

Gegenanzeigen

Behandlung von gegen Penicilline und Cephalosporine überempfindlichen Tieren; schwere Nierenfunktionsstörungen mit Anurie und Oligurie; Vorliegen von β-Laktamase bildenden Erregern; orale Anwendung bei ruminierenden Tieren und bei Pferden; orale Anwendung bei Kaninchen, Meerschweinchen, Hamstern und anderen Kleinnagern. Veyxyl® Tabs nicht bei Tieren mit einem Körpergewicht unter 40 kg anwenden.

Nebenwirkungen

Allergische Reaktionen (allergische Hautreaktionen, Anaphylaxie)

Beim Auftreten einer allergischen Reaktion ist ein sofortiges Absetzen von Veyxyl® Tabs erforderlich.

Gegenmaßnahmen:

Bei Anaphylaxie: Adrenalin (Epinephrin) und Glukokortikoide i.v.

Bei allergischen Hautreaktionen: Antihistaminika und/oder Glukokortikoide.

Nach oraler Anwendung kann es gelegentlich zu Störungen im Magen-Darm-Trakt (Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit) kommen.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierarten

Rinder, Schweine, Pferde, Schafe, Hunde

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Zum Eingeben:

Hund ab 40 kg Körpergewicht (KGW):

10 mg Amoxicillin pro kg KGW 2-mal täglich oral über 3 - 5 aufeinanderfolgende Tage (10 mg Amoxicillin pro kg KGW entsprechen 1/2 Tablette Veyxyl® Tabs pro 40 kg KGW).

Die Tablette kann auch mit dem Futter verabreicht werden.

Sollte 3 Tage nach Behandlungsbeginn keine deutliche Besserung des Krankheitszustandes eingetreten sein, ist eine Überprüfung der Diagnose und gegebenenfalls eine Therapieumstellung durchzuführen. Der Nachweis der Empfindlichkeit der Erreger wird empfohlen. Nach Abklingen der klinischen Symptome sollte die Behandlung noch 2 Tage fortgesetzt werden.

Zur intrauterinen Anwendung:

Dosis pro Behandlung:

Pferd: 800 mg Amoxicillin, entsprechend 1 Tablette Veyxyl® Tabs

Rind: 400 - 800 mg Amoxicillin,
entsprechend 1/2 - 1 Tablette Veyxyl® Tabs

Schaf, Schwein: 400 mg Amoxicillin, entsprechend 1/2 Tablette Veyxyl® Tabs

Zwei Behandlungen im Abstand von 2 Tagen. Der Nachweis der Empfindlichkeit der Erreger wird empfohlen.

Hinweise für die richtige Anwendung

Keine Angaben.

Wartezeit

| | | |
|----------------------------|----------------|--------|
| <u>Rind, Schaf, Pferd:</u> | essbare Gewebe | 4 Tage |
| | Milch | 2 Tage |
| <u>Schwein:</u> | essbare Gewebe | 4 Tage |

Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Trocken und nicht über 25 °C lagern.

Besondere Warnhinweise

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Keine Angaben

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Keine Angaben.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Anwender, bei denen eine Penicillinempfindlichkeit bekannt ist, sollten den direkten Kontakt des Arzneimittels mit der Haut oder den Schleimhäuten vermeiden.

Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode:

Keine Angaben.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Hinsichtlich der antibakteriellen Wirkung besteht ein potentieller Antagonismus von Penicillinen und Chemotherapeutika mit rasch einsetzender bakteriostatischer Wirkung.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen und Gegenmittel), falls erforderlich:

Nach Überdosierungen können zentralnervöse Erregungsscheinungen und Krämpfe auftreten. Veyxyl® Tabs sind sofort abzusetzen und es ist entsprechend symptomatisch zu behandeln (Gabe von Benzodiazepinen oder Barbituraten als Antidot).

Inkompatibilitäten:

Keine Angaben

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammlstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Verschreibungspflichtig

Packungsgrößen

Schiebeschachtel mit 10 Tabletten

Nachfüllpackung à 100 Tabletten

Die Angaben in diesem Katalogblatt entsprechen dem Kenntnisstand bei dessen Fertigstellung. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.



Veyx-Pharma ist GMP-, QS- und VLOG-zertifiziert.

Veyx-Pharma GmbH · Söhreweg 6 · 34639 Schwarzenborn · Deutschland
Tel. 05686 99860 · E-Mail zentrale@veyx.de
www.veyx.de