

Veyxyl® Tabs



800 mg/Tablette

Tablette für Rinder, Schweine, Pferde, Schafe, Hunde

NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND WENN UNTERSCHIEDLICH DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Deutschland

BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Veyxyl® Tabs, 800 mg/Tablette
Tablette für Rinder, Schweine, Pferde, Schafe, Hunde
Wirkstoff: Amoxicillin als Amoxicillin-Trihydrat

WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Tablette enthält:

Wirkstoff:

Amoxicillin 800,00 mg (entsprechend 918,48 mg Amoxicillin-Trihydrat)

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Behandlung von folgenden, durch grampositive und/oder gramnegative Amoxicillin-empfindliche Keime hervorgerufene Krankheiten:

Hund, orale Anwendung:

Infektionen der Lunge und der Atemwege, Infektionen des Verdauungsapparates, Infektionen im Urogenitalbereich, lokalisierte Infektionen, bakterielle Sekundärinfektionen infolge von Viruserkrankungen.

Rind, Schwein, Pferd, Schaf; intrauterine Anwendung:

Infektionen des Endometriums, Nachgeburtsverhaltung

Vor der Anwendung von Veyxyl® Tabs sollte die Empfindlichkeit der Erreger nachgewiesen werden. Dies gilt aufgrund sehr hoher Resistenzraten bei *E. coli* und Salmonellen gegenüber Amoxicillin insbesondere für die Behandlung von Infektionen des Verdauungsapparates.

GEGENANZEIGEN

Behandlung von gegen Penicilline und Cephalosporine überempfindlichen Tieren; schwere Nierenfunktionsstörungen mit Anurie und Oligurie; Vorliegen von β -Laktamase bildenden Erregern; orale Anwendung bei ruminierenden Tieren und bei Pferden; orale Anwendung bei Kaninchen, Meerschweinchen, Hamstern und anderen Kleinnagern. Veyxyl® Tabs nicht bei Tieren mit einem Körpergewicht unter 40 kg anwenden.

NEBENWIRKUNGEN

Allergische Reaktionen (allergische Hautreaktionen, Anaphylaxie)
Beim Auftreten einer allergischen Reaktion ist ein sofortiges Absetzen von Veyxyl® Tabs erforderlich.

Gegenmaßnahmen:

Bei Anaphylaxie: Adrenalin (Epinephrin) und Glukokortikoide i.v.

Bei allergischen Hautreaktionen: Antihistaminika und/oder Glukokortikoide.

Bei oraler Gabe kann es gelegentlich zu Störungen im Magen-Darm-Trakt (Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit) kommen.

Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermaßen definiert:

- Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen)
- Häufig (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren)
- Gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 1000 behandelten Tieren)

- Selten (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10.000 behandelten Tieren)
- Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschließlich Einzelfallberichte).

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

ZIELTIERARTEN

Rinder, Schweine, Pferde, Schafe, Hunde

DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zum Eingeben:

Hund ab 40 kg Körpergewicht (KGW):

10 mg Amoxicillin pro kg KGW 2-mal täglich oral über 3 - 5 aufeinanderfolgende Tage (10 mg Amoxicillin pro kg KGW entsprechen ½ Tablette Veyxyl® Tabs pro 40 kg KGW).

Die Tablette kann auch mit dem Futter verabreicht werden.

Sollte 3 Tage nach Behandlungsbeginn keine deutliche Besserung des Krankheitszustandes eingetreten sein, ist eine Überprüfung der Diagnose und gegebenenfalls eine Therapieumstellung durchzuführen. Der Nachweis der Empfindlichkeit der Erreger wird empfohlen. Nach Abklingen der klinischen Symptome sollte die Behandlung noch 2 Tage fortgesetzt werden.

Zur intrauterinen Anwendung:

Dosis pro Behandlung:

Pferd: 800 mg Amoxicillin, entsprechend 1 Tablette Veyxyl® Tabs

Rind: 400 - 800 mg Amoxicillin, entsprechend ½ - 1 Tablette Veyxyl® Tabs

Schaf, Schwein: 400 mg Amoxicillin, entsprechend ½ Tablette Veyxyl® Tabs

Zwei Behandlungen im Abstand von 2 Tagen. Der Nachweis der Empfindlichkeit der Erreger wird empfohlen.

HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Keine Angaben.

WARTEZEIT

Rind, Schaf, Pferd: essbare Gewebe: 4 Tage, Milch: 2 Tage

Schwein: essbare Gewebe: 4 Tage

BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Trocken und nicht über 25 °C lagern

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Keine Angaben

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Keine Angaben.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Anwender, bei denen eine Penicillinempfindlichkeit bekannt ist, sollten den direkten Kontakt des Arzneimittels mit der Haut oder den Schleimhäuten vermeiden.

Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode:

Keine Angaben.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Hinsichtlich der antibakteriellen Wirkung besteht ein potentieller Antagonismus von Penicillinen und Chemotherapeutika mit rasch einsetzender bakteriostatischer Wirkung.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen und Gegenmittel), falls erforderlich:

Nach Überdosierungen können zentralnervöse Erregungserscheinungen und Krämpfe auftreten. Veyxyl® Tabs sind sofort abzusetzen und es ist entsprechend symptomatisch zu behandeln (Gabe von Benzodiazepinen oder Barbituraten als Antidot).

Inkompatibilitäten:

Keine Angaben

BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE:

05.2022

WEITERE ANGABEN*Packungsgrößen:*

Polystyrol-Schiebeschachtel mit 10 Tabletten

Nachfüllpackung à 100 Tabletten